

长期打鼾不过气 须警惕静脉畸形



静脉畸形是最常见的血管畸形,其中60%发生在头颈部,不仅影响患者的容貌,引发疼痛、溃疡、出血,还可压迫或侵犯附近组织器官,从而影响语言、吞咽及呼吸功能,甚至危及生命。

长期打鼾如雷响, 竟查出患了静脉畸形

50多岁的孙师傅从年轻时起就有打鼾的习惯,但他一直没有在意。但是近两年,他的鼾声越地响。爱人还发现他有时嘴唇发紫,好像喘不过来气一样。不仅如此,孙师傅有时觉得心慌,只有半卧才

能入睡。他来到我院口腔科,竟被查出患了静脉畸形,气道被堵,呼吸自然不顺畅。

在常规检测患者肝、肾功能,询问其有无药物过敏史,并与其家属沟通病情与治疗方案后,孟箭主任对其采取DSA引导下介入栓塞治疗。即在DSA引导下,将介入穿刺针经皮刺入血管瘤腔,保留造影针头于静脉入口处,原位向瘤体内分次快速推注药物。

什么是静脉畸形?

据孟箭介绍,血管瘤指的是起源于血

管内皮细胞的真性肿瘤,肿块由名符其实的肿瘤细胞组成,最常见的是婴幼儿的毛细血管瘤。此类血管瘤多为良性,不会恶变。而先天性血管畸形是肿块内没有肿瘤细胞。从单个细胞水平看,都是正常的。但是这些正常的细胞排列组合出现了问题;或者细胞的解剖位置错了,出现在不该出现的部位;或者原本在胚胎后期应该消失的细胞结构,因某些原因没有消退从而导致畸形。

治疗血管畸形的首选方法 ——DSA引导下介入栓塞治疗

先天性血管畸形一般生下来就比较明显,生长也没有血管瘤迅速,但血管畸形是不会自愈的,治疗起来也远比血管瘤要复杂。传统用于治疗静脉畸形的的方法有手术切除、激光、放疗、冷冻及姑息性压迫疗法等,但这均有局限性。

“在DSA引导下介入栓塞治疗颌面部的血管瘤和血管畸形已为临床所肯定,具有创伤小、痛苦轻、费用低的优点,也逐步成为治疗血管畸形的首选方法。”孟主任说,药物介入静脉畸形的栓塞治疗,其关键是在造影指导下寻找和确定畸形血管团或浸润型病变的微漏,并将其栓塞,从而达到治疗的目的。这一技术也获得省卫生厅新技术二等奖。

徐毓蔓

支持专家:

口腔科主任、主任医师 孟箭
专家门诊时间:周一全天、周五全天
联系电话:18952170986

你需要知道的关于产前诊断的小知识



在胎内早期即夭折流产,存活者有明显的智能落后、特殊面容,生长发育障碍和多发畸形。唐氏综合征的患儿常伴有先天性心脏病;因免疫功能低下,易患各种感染;白血病的发生率比一般增高10~30倍;男性常为隐睾;尚可见伴发斜视,眼震,气管食管瘘,脐疝,十二指肠闭锁,甲状腺病等,偶见癫痫发作。

什么是产前筛查?

产前筛查即根据孕妇血清中HCG、AFP及游离雌三醇浓度,结合孕妇年龄、体重,筛选出孕期遗传、发育相关疾病。

产前筛查通常检查哪几种缺陷?

目前我院产前诊断中心可筛查以下3种疾病:

- 1、21-三体综合征(又称先天愚型,唐氏综合症),占整个新生儿染色体病的90%,是产前筛查的重点。
- 2、18-三体综合征(又称爱德华氏综合症)。
- 3、神经管畸形(如无脑儿、开放性脊柱裂等)。

产前筛查是根据孕妇体内某些特异

性生化指标,结合孕妇其他资料经过专用软件分析计算出胎儿罹患21-三体综合征、18-三体综合征、神经管畸形缺陷的风险度,因此,检查出来的结果只是一个风险度,而不是平常其他检查的是否正常的结果,所以:

- 1、得到高风险的结果不必紧张,它并不意味着胎儿一定有遗传疾病或者出生缺陷,知识这种可能性相对较高,需要进一步通过确诊检查来证实。
- 2、中风险人群(1/1000≤唐氏综合征风险值<1/270,1/1000≤18-三体综合征风险值<1/350)因为考虑到产前筛查的检出率相对较低,也就是说出现阴性漏筛率相对较高,故临床会定义一个中风险建议进行精准筛查(胎儿无创DNA检测)。
- 3、低风险,并非“零”风险,并不能完全排除缺陷儿,包括先天愚型儿。

徐毓蔓

支持专家:

产前诊断中心主任、主任医师 翟敬芳
专家门诊时间:
周五全天、周六全天(妇产科)
周一全天、周三全天(产前诊断门诊)
咨询电话:18012018649

“10·8 全国高血压日”

关于高血压, 这些知识你应该知道!

10月8日是“全国高血压日”,今年的主题是“知晓您的血压”。高血压被称作“无声杀手”,患病后可能没有症状,患者通常不会主动寻求检测与治疗。随着生活水平的提高,它正剥夺越来越多人的健康,且发病人群还有年轻化趋势。

可能导致高血压的病因有哪些?

- 年龄:40岁以上人群的高血压发病率是15-39岁时的3.4倍;
- 遗传:高胆固醇家族史应注意;
- 性别:男性风险高于女性;
- 超重:特别是腹部、大腿脂肪多的人;
- 高盐饮食:饮食过成是导致高血压的重要原因;
- 爱喝酒:酗酒者的血压比不喝酒者平均高出4毫米汞柱;
- 压力过大:精神紧张是高血压发病的重要诱因;
- 缺乏运动:缺乏运动易导致肥胖,心脏长期负担过重诱发左心肥厚,血压升高;
- 长期服药:特别是抗过敏药或激素类药物;

高血压的基本症状有哪些?

- 按我国现行标准,血压超过140/90毫米汞柱即视为高血压。
- 头晕:突然下蹲或起立时出现,有些是持续性的;
- 头痛:头痛常发生在早晨睡醒时,洗脸或早餐后有所缓解,运动或精神疲惫后会加重;
- 性情急躁,入睡困难,易惊醒;
- 注意力不集中,记忆力减退,难记住近期的事情;
- 肢体麻木:足趾、手指麻木,颈背肌肉酸痛等;
- 出血:高血压会导致动脉硬化,血管弹性减弱,容易破裂出血。

高血压并发症有哪些?

- 肾动脉硬化:血压长期升高会引起肾动脉硬化,进而发展为肾硬化,导致肾功能损害。肾功能损害反过来又使血压进一步升高,形成恶性循环。
- 眼底病变:高血压患者中约70%会发生眼底病变,严重者甚至失明。
- 分娩风险:孕妇如有高血压,将面临巨大分娩风险,严重时甚至可造成孕妇和新生儿死亡。

儿童也会患高血压?

- 北京大学一项调口显示,肥胖儿童发生高血压的风险是正常体重儿童的3.9倍,发生高胆固醇的风险是正常体重儿童的5.8倍。
- 孩子一旦被确诊患有高血压,须先查找有没有引起血压升高的肾脏、心血管、肾血管、内分泌等方面的疾病,而后积极治疗。

整理:徐毓蔓